貝毒プランクトン調査

調査年月日	令和6年5月15日		単位：cells/mL	9:00～	
種類　／地点番号	①	②	③	④	
	北灘宗清	北灘国永	北灘牛ノ浦	家串	
5m水温（℃）	19.0	19.0	19.0	19.9	
珪藻類	2,185	5,700	13,500	1,470	
<貝毒プランクトン>					
アレキサンドリウム属	0	0.002	0	0	
ギムノディニウム・カテナータム	0.060	0.014	0.040	0	
ディノフィシス属	0	0.003	0	0	
<有害プランクトン>					
カレニア・ミキモトイ	0	0	0	0	
コクロディニウム・ポリクリコイデス	0	0	0	0	
ヘテロシグマ・アカシオ	0	0	0	0	
種類　／地点番号					
5m水温（℃）					
珪藻類					
<貝毒プランクトン>					
アレキサンドリウム属					
ギムノディニウム・カテナータム					
ディノフィシス属					
<有害プランクトン>					
カレニア・ミキモトイ					
コクロディニウム・ポリクリコイデス					
ヘテロシグマ・アカシオ					

状況	本日の調査では、最大0.060cells/mLのギムノディニウム・カテナータムが確認されました。 岩松湾では二枚貝の毒化が確認されていますので、採取・喫食を控えるとともに、今後の動向にご注意ください。 ※0～7m各層を等量混合し、1,000倍濃縮検鏡。 【危険濃度】 アレキサンドリウム属（麻痺性貝毒） 500cells/mL ギムノディニウム・カテナータム（麻痺性貝毒） 0.1cells/mL ディノフィシス属（下痢性貝毒） 500cells/mL