

(3)大豆奨励品種特性表

種 類	早 中 晩	区 分 (銘柄)	品 種 名	来 歴 (育成場所 育成年)	採 用 年 次	栽 培 面 積 (合5)	供 試 年 次	播 種 期	開 花 期	成 熟 期	生 態 型	主 茎 長	分 枝 数	主 茎 節 数	葉 型	伸 長 型	(草 型)	毛 茸 の 有 無 及 び 色	花 色	熟 莢 色	裂 莢 性
大 豆	中 の 中	中 粒 白 目	タマホマレ	Lee×東山7号 (フジミジロ) (長野総農試 中信試 昭和55年)	昭 55	0	平 18 〜 平 22	6.26	8.05	11.01	III C	53.2	4.0	12.3	中	有限		白	紫	褐	難
	中 の 晩	中 粒 褐 目	フクユタカ	岡大豆× 白大豆3号 (九州農試 昭和55年)	昭 61	342	令 1 〜 令 5	7.04	8.17	11.07	IV C	79.4	4.4	15.3	円	有限		白	紫	淡 褐	中
	晩 の 早	大 粒 黒 大豆	丹波黒	兵庫農試より 取寄せ (大正13年)	昭 3	-	昭 48 〜 昭 52	6.21	8.12	11.27	IV C	67	4.2	14.0	中	有限		褐	紫	褐	中

子 実					粗 蛋 白 質	粗 脂 肪	病 害 虫 抵 抗 性				環 境 抵 抗 性				適 地	栽 培 適 性	概 評			
百 粒 重	粒 形	裂 皮	種 皮 色	臍 色			10 a 当 た り 量	紫 斑 病	ウ イ ル ス 病	カ メ ム シ 類	ハ ス モ ン ヨ ト ウ	密 植 適 応 性	耐 肥 性	耐 倒 伏 性			耐 湿 性	蔓 化 の 難 易	遅 播 適 応 性	優 点
31.8	球	微 少	黄	黄	471	中	中	中	中	大	強	強	中	難	中	県 下 全 域	転換畑 向き 早 多 良 質 機 械 収 穫 に 適 す る	紫斑病 弱		
34.8	球	少	黄 白	淡 褐	509	強	中	中	中	中	中	中	中	中	中	大	県 下 全 域	畑作及 び 転 換 畑 向 き 多 収 良 質 高 蛋 白	耐倒伏性 中	
45.8	扁 球	多	黒	暗 褐	256	-	-	-	弱	中	中	中	中	弱	中	易	大	県 下 全 域	畑作及 び 転 換 畑 向 き 煮 豆 用 多 収	倒伏・ 蔓化が 易 ウ イ ル ス 病 弱 裂 皮 多

(注:タマホマレ・フクユタカは転換畑、丹波黒は畑にて調査)