


6 林 業

項 目	作 業 内 容																									
シイタケ栽培について	<p>(今月の作業のポイント)</p> <ul style="list-style-type: none"> ・新たなホダ木を作るための作業 ○原木の選定、○原木の伐採 ・これからシイタケを発生させるための作業 ○ホダ場の選定、○ホダ起こし <p>原木の伐採等作業を実施するためには、毎日発表される週間天気予報を確認する。</p>																									
(1) 原木の選定	<p>シイタケ原木の最適樹種は、クヌギ、コナラであるが、カシ類、シイ類、シデ類、アベマキも適樹種である。</p> <p>また、原木に適する樹齢は、クヌギ、コナラが10～25年生、カシ類、シイ類、シデ類が30年生以上である。</p>																									
(2) 原木の伐採	<p>シイタケ原木の伐採適期は、クヌギでは3分黄葉期で、晴天が数日続いている時がよい。この時期は、樹液の流れが少なくなり樹皮がはげにくくなる。</p> <p>一方、まだ葉からの蒸散が行われているため、伐採後の「葉枯らし」により、葉の蒸散作用で辺材部の水分が抜けて材組織の枯死が進み、シイタケ菌糸がまん延するのに適した原木状態となる。(表1、写真1)</p> <p>この「葉枯らし」の期間は1～2ヶ月ぐらいが適当であるが、伐採地の地形や環境、樹種、原木の大きさ、気象条件などを考慮して決める。</p> <p>伐採時の注意事項は次のとおり。</p> <p>ア 安全作業を心がけ、ロープ等で伐採方向を定める。(写真1)</p> <p>イ 伐倒方向は、斜面に向かって上方向か水平方向とする。</p> <p>ウ 伐採した原木の伐り口を切り株や石などの上に乗せ、伐り口をできるだけ地面につけない。(写真2)</p>																									
	<p>表1 原木の伐採適期</p> <table border="1" data-bbox="391 1579 1332 1892"> <thead> <tr> <th data-bbox="391 1579 782 1680">樹 種 伐採時期</th> <th data-bbox="782 1579 901 1680">クヌギ</th> <th data-bbox="901 1579 1029 1680">コナラ</th> <th data-bbox="1029 1579 1181 1680">カシ類 シイ類</th> <th data-bbox="1181 1579 1332 1680">シデ類</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="391 1680 782 1736">黄葉初期から3分黄葉</td> <td data-bbox="782 1680 901 1736">◎</td> <td data-bbox="901 1680 1029 1736">◎</td> <td data-bbox="1029 1680 1181 1736"></td> <td data-bbox="1181 1680 1332 1736">◎</td> </tr> <tr> <td data-bbox="391 1736 782 1792">4分黄葉から7分黄葉</td> <td data-bbox="782 1736 901 1792">○</td> <td data-bbox="901 1736 1029 1792">◎</td> <td data-bbox="1029 1736 1181 1792"></td> <td data-bbox="1181 1736 1332 1792"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="391 1792 782 1848">寒期(1月～2月上旬)</td> <td data-bbox="782 1792 901 1848"></td> <td data-bbox="901 1792 1029 1848">○</td> <td data-bbox="1029 1792 1181 1848">◎</td> <td data-bbox="1181 1792 1332 1848"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="391 1848 782 1892">春期(2月中～3月上旬)</td> <td data-bbox="782 1848 901 1892"></td> <td data-bbox="901 1848 1029 1892">○</td> <td data-bbox="1029 1848 1181 1892"></td> <td data-bbox="1181 1848 1332 1892">○</td> </tr> </tbody> </table> <p>※この表は標準であって、場所、その年の気象条件などで、若干差が生じる場合がある。 ◎…最適期 ○…適期</p> <p>※老齢木は黄葉初期に伐採する。</p>	樹 種 伐採時期	クヌギ	コナラ	カシ類 シイ類	シデ類	黄葉初期から3分黄葉	◎	◎		◎	4分黄葉から7分黄葉	○	◎			寒期(1月～2月上旬)		○	◎		春期(2月中～3月上旬)		○		○
樹 種 伐採時期	クヌギ	コナラ	カシ類 シイ類	シデ類																						
黄葉初期から3分黄葉	◎	◎		◎																						
4分黄葉から7分黄葉	○	◎																								
寒期(1月～2月上旬)		○	◎																							
春期(2月中～3月上旬)		○		○																						

項 目	作 業 内 容
	<p>エ 伐採の時、すでに害菌や穿孔虫などの侵入を受けている元玉などの被害部は取り除く。</p>  <p>写真1 原木の伐採の状況</p>  <p>写真2 葉枯らしの状況</p>
<p>(3) ホダ場選 定</p>	<p>ホダ場の温度条件と使用品種が合っていないと品種の特性が発揮しにくい。特に、低温系品種はこの傾向が強いので、なるべく南から東南向きの日当たりが良く、昼夜の温度較差が大きい場所をホダ場に選定する。</p>
<p>(4) ホダ起こ し</p>	<p>シイタケ菌糸が十分に蔓延したホダ木を、シイタケの発生環境に適した林内のホダ場に移し、シイタケが変形せずに生長し、採取しやすいようにホダ木を組み変えることを「ホダ起こし」という。ホダ起こしは最低気温が数日間におたり、使用品種の芽切り温度以下になってから実施する。</p> <p>ホダ起こし時の注意事項は次のとおり。</p> <p>ア シイタケ菌糸の蔓延したホダ木は、原木にくらべて樹皮が傷付き易くなっている。このため、作業時に樹皮部が損傷すると、損傷部やその周辺部が乾燥してシイタケ菌が衰弱・死滅し、その部分から害菌のトリコデルマなどが侵入し大きな被害を受けることがあるので、取扱いに注意する。</p> <p>イ 作業中、ホダ木に直射日光が当たると高温障害を起こし、シイタケ菌糸は衰弱して害菌の侵入を受け易くなるので、特に裸地伏せ地での作業は笠木を</p>

	<p>一度に取り除かないなど、直射日光が当たらないよう注意する。</p> <p>ウ ホダ木を、ホダ場まで運び一箇所に積んだまましばらく置く場合が多いが、その間は直射日光が当たらないようホダ木を保護する。</p> <p>エ ホダ木の組み方は、ヨロイ、ムカデ、合掌等の方法があるが、一般には合掌がシイタケを採取しやすい。</p> <p>オ ホダ木は、品種別、太さ別、樹種別に組んでおくと、発生操作、採取・選別などに都合が良い。</p>
--	---

(作成 林業研究センター)