

(表2) 主要死因順位別死亡数・率(人口10万対)の年次推移(全国)

| 年次 | 1 位 | | 2 位 | | 3 位 | | 4 位 | | 5 位 | |
|----|-------|--------------------|-------|--------------------|-------|--------------------|--------------|-------------------|-------|------------------|
| | 死 因 | 実 数 (率) | 死 因 | 実 数 (率) | 死 因 | 実 数 (率) | 死 因 | 実 数 (率) | 死 因 | 実 数 (率) |
| 40 | 脳血管疾患 | 172,733 (175.8) | 悪性新生物 | 106,536 (108.4) | 心疾患 | 75,672 (77.0) | 老衰 | 49,092 (50.0) | 不慮の事故 | 40,188 (40.9) |
| 45 | 〃 | 181,315 (175.8) | 〃 | 119,977 (116.3) | 〃 | 89,411 (86.7) | 不慮の事故 | 43 (33.7) | 老衰 | 39,277 (38.1) |
| 50 | 〃 | 174,367 (156.7) | 〃 | 136,383 (122.6) | 〃 | 99,226 (89.2) | 肺炎及び 気管支炎 | 37,462 (33.7) | 不慮の事故 | 33,710 (30.3) |
| 55 | 〃 | 162,317 (139.5) | 〃 | 161,764 (139.1) | 〃 | 123,505 (106.2) | 〃 | 39,241 (33.7) | 〃 | 32,154 (27.6) |
| 60 | 悪性新生物 | 187,714 (156.1) | 心疾患 | 141,097 (117.3) | 脳血管疾患 | 134,994 (112.2) | 〃 | 51,366 (42.7) | 〃 | 29,597 (24.6) |
| 平2 | 〃 | 217,413 (177.2) | 〃 | 165,478 (134.8) | 〃 | 121,944 (99.4) | 〃 | 74,535 (60.7) | 〃 | 32,122 (26.2) |
| 7 | 〃 | 263,022 (211.6) | 脳血管疾患 | 146,552 (117.9) | 心疾患 | 139,206 (112.0) | 肺炎 | 79,629 (64.1) | 〃 | 45,323 (36.5) |
| 12 | 〃 | 295,484 (235.2) | 心疾患 | 146,741 (116.8) | 脳血管疾患 | 132,529 (105.5) | 〃 | 86,938 (69.2) | 〃 | 39,484 (31.4) |
| 13 | 〃 | 300,658 (238.8) | 〃 | 148,292 (117.8) | 〃 | 131,856 (104.7) | 〃 | 85,305 (67.8) | 〃 | 39,496 (31.4) |
| 14 | 〃 | 304,568 (241.7) | 〃 | 152,518 (121.0) | 〃 | 130,257 (103.4) | 〃 | 87,421 (69.4) | 〃 | 38,643 (30.7) |
| 15 | 〃 | 309,543 (245.4) | 〃 | 159,545 (126.5) | 〃 | 132,067 (104.7) | 〃 | 94,942 (75.3) | 〃 | 38,714 (30.7) |
| 16 | 〃 | 320,358 (253.9) | 〃 | 159,625 (126.5) | 〃 | 129,055 (102.3) | 〃 | 95,534 (75.7) | 〃 | 38,193 (30.3) |
| 17 | 〃 | 325,941 (258.3) | 〃 | 173,125 (137.2) | 〃 | 132,847 (105.3) | 〃 | 107,241 (85.0) | 〃 | 39,863 (31.6) |
| 18 | 〃 | 329,314 (261.0) | 〃 | 173,024 (137.2) | 〃 | 128,268 (101.7) | 〃 | 107,242 (85.0) | 〃 | 38,270 (30.3) |
| 19 | 〃 | 336,468 (266.9) | 〃 | 175,539 (139.2) | 〃 | 127,041 (100.8) | 〃 | 110,159 (87.4) | 〃 | 37,966 (30.1) |
| 20 | 〃 | 342,963 (272.3) | 〃 | 181,928 (144.4) | 〃 | 127,023 (100.9) | 〃 | 115,317 (91.6) | 〃 | 38,153 (30.3) |
| 21 | 〃 | 344,105 (273.5) | 〃 | 180,745 (143.7) | 〃 | 122,350 (97.2) | 〃 | 112,004 (89.0) | 老衰 | 38,670 (30.7) |
| 22 | 〃 | 353,499 (279.7) | 〃 | 189,360 (149.8) | 〃 | 123,461 (97.7) | 〃 | 118,888 (94.1) | 〃 | 45,342 (35.9) |
| 23 | 〃 | 357,305 (283.2) | 〃 | 194,926 (154.5) | 肺炎 | 124,749 (98.9) | 脳血管疾患 | 123,867 (98.2) | 不慮の事故 | 59,416 (47.1) |
| 24 | 〃 | 360,963 (286.6) | 〃 | 198,836 (157.9) | 〃 | 123,925 (98.4) | 〃 | 121,602 (96.5) | 老衰 | 60,719 (48.2) |
| 25 | 〃 | 364,872 (290.3) | 〃 | 196,723 (156.5) | 〃 | 122,969 (97.8) | 〃 | 118,347 (94.1) | 〃 | 69,720 (55.5) |
| 26 | 〃 | 368,103 (293.5) | 〃 | 196,925 (157.0) | 〃 | 119,650 (95.4) | 〃 | 114,207 (91.1) | 〃 | 75,389 (60.1) |
| 27 | 〃 | 370,346 (295.5) | 〃 | 196,113 (156.5) | 〃 | 120,953 (96.5) | 〃 | 111,973 (89.4) | 〃 | 84,810 (67.7) |
| 28 | 〃 | 372,986 (298.3) | 〃 | 198,006 (158.4) | 〃 | 119,300 (95.4) | 〃 | 109,320 (87.4) | 〃 | 92,806 (74.2) |
| 29 | 〃 | 373,334 (299.5) | 〃 | 204,837 (164.3) | 脳血管疾患 | 109,880 (88.2) | 老衰 | 101,396 (81.3) | 肺炎 | 96,841 (77.7) |
| 30 | 〃 | 373,584 (300.7) | 〃 | 208,221 (167.6) | 老衰 | 109,605 (88.2) | 脳血管疾患 | 108,186 (87.1) | 〃 | 94,661 (76.2) |
| 令元 | 〃 | 376,425 (304.2) | 〃 | 207,714 (167.9) | 〃 | 121,863 (98.5) | 〃 | 106,552 (86.1) | 〃 | 95,518 (77.2) |

注) 死因分類の改正により年次別比較には完全な内容の一致をみることはできない。

心疾患 昭和54年以降は、心臓麻痺、心臓衰弱を含む。
腎不全 平成7年以降は、先天性腎不全を含まない。
不慮の事故・自殺 平成7年以降は、後遺症を含まない、等

| 6 位 | | 7 位 | | 8 位 | | 9 位 | | 10 位 | |
|-------|------------------|------------|------------------|----------------|------------------|----------------|------------------|---------------|------------------|
| 死 因 | 実 数 (率) | 死 因 | 実 数 (率) | 死 因 | 実 数 (率) | 死 因 | 実 数 (率) | 死 因 | 実 数 (率) |
| 肺炎及び | 36,663 (37.3) | 全結核 | 22,366 (22.8) | 高血圧性 疾患 | 18,987 (19.3) | 自殺 | 14,444 (14.7) | 胃腸炎 | 12,705 (12.9) |
| 〃 | 35,142 (34.1) | 高血圧性 疾患 | 18,303 (17.7) | 全結核 | 15,899 (15.4) | 〃 | 15,728 (15.3) | 肝硬変 | 12,898 (12.5) |
| 老衰 | 29,916 (26.9) | 自殺 | 19,975 (18.0) | 高血圧性 疾患 | 19,831 (17.8) | 肝硬変 | 15,129 (13.6) | 全結核 | 10,567 (9.5) |
| 不慮の事故 | 29,217 (25.1) | 〃 | 20,542 (17.7) | 慢性肝疾患 及び肝硬変 | 16,490 (14.2) | 高血圧症 疾患 | 15,911 (13.7) | 腎炎及びネ フローゼ | 10,180 (8.8) |
| 老衰 | 27,804 (23.1) | 〃 | 23,383 (19.4) | 〃 | 17,174 (14.3) | 腎炎及びネ フローゼ | 13,521 (11.2) | 高血圧症 疾患 | 12,700 (10.6) |
| 〃 | 24,187 (19.7) | 〃 | 20,088 (16.4) | 腎炎及び ネフローゼ | 17,140 (14.0) | 慢性肝疾患 及び肝硬変 | 16,804 (13.7) | 糖尿病 | 9,470 (7.7) |
| 〃 | 21,493 (17.3) | 〃 | 21,420 (17.2) | 肝疾患 | 17,018 (13.7) | 腎不全 | 16,187 (13.0) | 〃 | 14,225 (11.4) |
| 自殺 | 30,251 (24.1) | 老衰 | 21,213 (16.9) | 腎不全 | 17,260 (13.7) | 肝疾患 | 16,079 (12.8) | 慢性閉塞性 肺疾患 | 12,841 (10.2) |
| 〃 | 29,375 (23.3) | 〃 | 22,145 (17.6) | 〃 | 17,690 (14.0) | 〃 | 15,848 (12.6) | 〃 | 13,069 (10.4) |
| 〃 | 29,949 (23.8) | 〃 | 22,682 (18.0) | 〃 | 18,185 (14.4) | 〃 | 15,480 (12.3) | 〃 | 13,021 (10.3) |
| 〃 | 32,109 (25.5) | 〃 | 23,449 (18.6) | 〃 | 18,821 (14.9) | 〃 | 15,737 (12.5) | 〃 | 13,626 (10.8) |
| 〃 | 30,247 (24.0) | 〃 | 24,126 (19.1) | 〃 | 19,117 (15.2) | 〃 | 15,885 (12.6) | 〃 | 13,444 (10.7) |
| 〃 | 30,553 (24.2) | 〃 | 26,360 (20.9) | 〃 | 20,528 (16.3) | 〃 | 16,430 (13.0) | 〃 | 14,416 (11.4) |
| 〃 | 29,921 (23.7) | 〃 | 27,764 (22.0) | 〃 | 21,158 (16.8) | 〃 | 16,267 (12.9) | 〃 | 14,357 (11.4) |
| 〃 | 30,827 (24.4) | 〃 | 30,734 (24.4) | 〃 | 21,632 (17.2) | 〃 | 16,195 (12.8) | 〃 | 14,907 (11.8) |
| 老衰 | 35,975 (28.6) | 自殺 | 30,229 (24.0) | 〃 | 22,517 (17.9) | 〃 | 16,268 (12.9) | 〃 | 15,520 (12.3) |
| 不慮の事故 | 37,756 (30.0) | 〃 | 30,707 (24.4) | 〃 | 22,743 (18.1) | 〃 | 15,969 (12.7) | 〃 | 15,359 (12.2) |
| 〃 | 40,732 (32.2) | 〃 | 29,554 (23.4) | 〃 | 23,725 (18.8) | 慢性閉塞性 肺疾患 | 16,293 (12.9) | 肝疾患 | 16,216 (12.8) |
| 老衰 | 52,242 (41.4) | 〃 | 28,896 (22.9) | 〃 | 24,526 (19.4) | 〃 | 16,639 (13.2) | 〃 | 16,390 (13.0) |
| 不慮の事故 | 41,031 (32.6) | 〃 | 26,433 (21.0) | 〃 | 25,107 (19.9) | 〃 | 16,402 (13.0) | 〃 | 15,980 (12.7) |
| 〃 | 39,574 (31.5) | 〃 | 29,063 (20.7) | 〃 | 25,101 (20.0) | 〃 | 16,443 (13.1) | 大動脈瘤及 び解離 | 16,105 (12.8) |
| 〃 | 39,029 (31.1) | 腎不全 | 24,776 (19.8) | 自殺 | 24,417 (19.5) | 大動脈瘤及 び解離 | 16,423 (13.1) | 慢性閉塞性 肺疾患 | 16,184 (12.9) |
| 〃 | 38,306 (30.6) | 〃 | 24,560 (19.6) | 〃 | 23,152 (18.5) | 〃 | 16,887 (13.5) | 〃 | 15,756 (12.6) |
| 〃 | 38,306 (30.6) | 〃 | 24,612 (19.7) | 〃 | 21,017 (16.8) | 〃 | 18,145 (14.5) | 肝疾患 | 15,773 (12.6) |
| 〃 | 40,329 (32.4) | 誤嚥性肺炎 | 35,788 (28.7) | 腎不全 | 25,134 (20.2) | 自殺 | 20,465 (16.4) | 血管性等の 認知症 | 19,546 (15.7) |
| 〃 | 41,238 (33.2) | 〃 | 38,460 (31.0) | 〃 | 26,081 (21.0) | 血管性等の 認知症 | 20,521 (16.5) | 自殺 | 20,031 (16.1) |
| 誤嚥性肺炎 | 40,385 (32.6) | 不慮の事故 | 39,184 (31.7) | 〃 | 26,644 (21.5) | 〃 | 21,394 (17.3) | アルツハイ マー病 | 20,730 (16.8) |