

貝毒プランクトン調査								
調 査 年 月 日	令和7年3月10日		11：30～		着色域なし			
調査者	水産研究センター							
出現状況	発生年月日	場所		発生範囲				
		三浦支所管内		下記のとおり				
被害状況	-		陸からの採水					
種類	／地点番号	①		②		③		
		船隠		夏秋		漁協前		
5m水温（℃）		12.9		13.1		13.1		
単位	cells/mL	採水層	2.5m	0-7m	5.0m	0-7m	4.0m	0-7m
珪藻類		23,600	17,800	15,700	15,200	15,000	13,800	
アレキサンドリウム属		3	3	27	21	17	6	
ギムノディニウム・カテナータム		0	0	0	0	0	0	
ディノフィシス属		0	1	3	1	1	1	
種類	／地点番号	④		⑤				
		豊浦		西支所				
5m水温（℃）		13.0		13.0				
単位	cells/mL	採水層	2.0m	0-7m	1.0m	0-7m		
珪藻類		6,700	7,000	13,700	8,000			
アレキサンドリウム属		0	6	0	2			
ギムノディニウム・カテナータム		0	0	0	0			
ディノフィシス属		0	1	0	0.085			
指導状況	本日の調査では、最大27cells/mLのアレキサンドリウム属が確認されました。 三浦地区では二枚貝の毒化が確認されていますので、採取・喫食を控えるとともに、 今後の動向にご注意ください。 ※「0～7m」表記は、0～7m各層を等量混合し、1,000倍濃縮検鏡したものの。 【危険濃度】 アレキサンドリウム属(麻痺性貝毒) 500cells/mL ディノフィシス属(下痢性貝毒) 500cells/mL							
								