

貝毒プランクトン調査

調査年月日		令和7年4月21日		単位：cells/mL		9:00～	
種類	／地点番号	⑨	⑩	⑪	⑫御荘湾	⑬御荘湾	
		北灘	家串	柏	御荘(平山)	成川	
5m水温 (°C)		17.2	18.1	17.5	18.3	18.5	
珪藻類		320	33	35	20	19	
<貝毒プランクトン>							
アレキサンドリウム属		0.007	0	0	0	0	
ギムノディニウム・カテナータム		0	0	0	0	0	
ディノフィシス属		0.008	0	0	0	0	
<有害プランクトン>							
カレニア・ミキモトイ		0	0	0	0	0	
コクロディニウム・ポリクリコイデス		0	0.027	0.027	19	0.021	
ヘテロシグマ・アカシオ		0	0	8	50	4	
シャトネラ属		0	0	0	0	0	
種類	／地点番号	⑬	⑭				
		船越	深浦				
5m水温 (°C)		18.7	19.1				
珪藻類		0	0				
<貝毒プランクトン>							
アレキサンドリウム属		3	2				
ギムノディニウム・カテナータム		0	0				
ディノフィシス属		0.001	0				
<有害プランクトン>							
カレニア・ミキモトイ		0	0				
コクロディニウム・ポリクリコイデス		0	0				
ヘテロシグマ・アカシオ		0	0				
シャトネラ属		0	0				
状況	本日の調査では、ギムノディニウム・カテナータムは確認されませんでした。 ※0～7m各層を等量混合し、1,000倍濃縮検鏡。						
	【危険濃度】 アレキサンドリウム属(麻痺性貝毒) 500cells/mL ディノフィシス属(下痢性貝毒) 500cells/mL コクロディニウム・ポリクリコイデス(赤潮原因種) 300cells/mL ヘテロシグマ・アカシオ(赤潮原因種) 50,000cells/mL						

