

# EHIME style ACS（急性冠症候群）パス

★患者様へ  
受診の際はこのパスを忘れずお持ちください。



令和7年7月発行

# ACS患者情報

性別 男 女 年齢 歳 氏名


PCI実施日( / / )

冠動脈ステント 有 無  
バルーンのみ

退院時 LVEF(%)

併存疾患：高血圧 糖尿病 脂質異常症  
喫煙 慢性腎臓病

心不全の程度：NYHA I・II・III・IV Stage A・B・C・D  
介護認定 有・無：要支援1・2 要介護1・2・3・4・5



/ /	/ /	/ /	/ /
<input type="checkbox"/> 基幹病院 <input type="checkbox"/> かかりつけ医			
kg	kg	kg	kg
/ mmHg	/ mmHg	/ mmHg	/ mmHg
息切れ、むくみ 胸痛、食欲低下	息切れ、むくみ 胸痛、食欲低下	息切れ、むくみ 胸痛、食欲低下	息切れ、むくみ 胸痛、食欲低下
mg/dL	mg/dL	mg/dL	mg/dL
mg/dL	mg/dL	mg/dL	mg/dL
%	%	%	%

# ACS管理パス

受診日 月/日	/ /	/ /	/ /
医療機関 基幹病院 ( )	<input type="checkbox"/> 基幹病院 <input type="checkbox"/> かかりつけ医	<input type="checkbox"/> 基幹病院 <input type="checkbox"/> かかりつけ医	<input type="checkbox"/> 基幹病院 <input type="checkbox"/> かかりつけ医
体重	kg	kg	kg
血圧	/ mmHg	/ mmHg	/ mmHg
自覚症状 ○で囲んで下さい。	息切れ、むくみ 胸痛、食欲低下	息切れ、むくみ 胸痛、食欲低下	息切れ、むくみ 胸痛、食欲低下
内服 アドヒアランス			
LDL-C	mg/dL	mg/dL	mg/dL
TG	mg/dL	mg/dL	mg/dL
HbA1c	%	%	%
禁煙継続 ○×			

# EHIME style ACS パス (リスク管理目標)

## 脂質管理

LDLコレステロール	70mg/dL未満
HDLコレステロール	40mg/dL以上
中性脂肪	150mg/dL未満
nonHDLコレステロール	130mg/dL未満



年齢75歳未満

75歳以上

## 血圧管理

診察室血圧	< 130/80 mmHg
家庭血圧	< 125/75 mmHg

診察室血圧	< 140/90 mmHg
家庭血圧	< 135/85 mmHg

## 糖尿病管理


HbA1c 7.0%未満

## 抗血栓薬 服薬状況

年 月 日に左主幹部 左前下行枝 左回旋枝 右冠動脈に  
経皮的冠動脈インターベンションを実施しています。  
現在下記の抗血栓薬を内服中です。  
バイアスピリン クロピドグレル エフィエント DOAC  
( )  
将来の出血性合併症軽減のため、患者のリスクを考慮し、下記の日程で薬剤の  
切り替えをお願いします。

年 月 日頃に以下の内服薬へ変更をお願いします。  
アスピリン クロピドグレル プラスグレル DOAC ( )

# EHIME style ACS パス (LDL管理)



/ /	/ /	/ /	/ /
□ 基幹病院 □ かかりつけ医	□ 基幹病院 □ かかりつけ医	□ 基幹病院 □ かかりつけ医	□ 基幹病院 □ かかりつけ医
kg	kg	kg	kg
/ mmHg	/ mmHg	/ mmHg	/ mmHg
息切れ、むくみ 胸痛、食欲低下	息切れ、むくみ 胸痛、食欲低下	息切れ、むくみ 胸痛、食欲低下	息切れ、むくみ 胸痛、食欲低下
mg/dL	mg/dL	mg/dL	mg/dL
mg/dL	mg/dL	mg/dL	mg/dL
%	%	%	%


# ACS管理パス

受診日 月/日	/ /	/ /	/ /
医療機関 基幹病院 ( )	<input type="checkbox"/> 基幹病院 <input type="checkbox"/> かかりつけ医	<input type="checkbox"/> 基幹病院 <input type="checkbox"/> かかりつけ医	<input type="checkbox"/> 基幹病院 <input type="checkbox"/> かかりつけ医
体重	kg	kg	kg
血圧	/ mmHg	/ mmHg	/ mmHg
自覚症状 ○で囲んで下さい。	息切れ、むくみ 胸痛、食欲低下	息切れ、むくみ 胸痛、食欲低下	息切れ、むくみ 胸痛、食欲低下
内服 アドヒアランス			
LDL-C	mg/dL	mg/dL	mg/dL
TG	mg/dL	mg/dL	mg/dL
HbA1c	%	%	%
禁煙継続 ○×			

	一般名	製品名	最大用量・規格
スタチン 関連薬	アトルバスタチン	リビトール	20mg(40mg)
	ロスバスタチン	クレストール	10mg(20mg)
	ピタバスタチン	リパロ	4mg
吸収抑制	エゼチミブ	ゼチーア	10mg
配合剤	アトルバスタチン+エゼチミブ配合剤	アトーゼットHD	HDスタチン20mg
	ロスバスタチン+エゼチミブ配合剤	ロソーゼットHD	HDスタチン5mg
PCSK9 関連薬	エボロクマブ(抗体医薬)	レパーサ	140mg
	インクリシラン(核酸医薬)	レクビオ	300mg

( )はFH用量

## 高用量投与開始



# ACS管理パス

受診日 月/日	/ /	/ /	/ /
医療機関 基幹病院 ( )	<input type="checkbox"/> 基幹病院 <input type="checkbox"/> かかりつけ医	<input type="checkbox"/> 基幹病院 <input type="checkbox"/> かかりつけ医	<input type="checkbox"/> 基幹病院 <input type="checkbox"/> かかりつけ医
体重	kg	kg	kg
血圧	/ mmHg	/ mmHg	/ mmHg
自覚症状 ○で囲んで下さい。	息切れ、むくみ 胸痛、食欲低下	息切れ、むくみ 胸痛、食欲低下	息切れ、むくみ 胸痛、食欲低下
内服 アドヒアランス			
LDL-C	mg/dL	mg/dL	mg/dL
TG	mg/dL	mg/dL	mg/dL
HbA1c	%	%	%
禁煙継続 ○×			

/ /	/ /	/ /	/ /
<input type="checkbox"/> 基幹病院 <input type="checkbox"/> かかりつけ医			
kg	kg	kg	kg
/ mmHg	/ mmHg	/ mmHg	/ mmHg
息切れ、むくみ 胸痛、食欲低下	息切れ、むくみ 胸痛、食欲低下	息切れ、むくみ 胸痛、食欲低下	息切れ、むくみ 胸痛、食欲低下
mg/dL	mg/dL	mg/dL	mg/dL
mg/dL	mg/dL	mg/dL	mg/dL
%	%	%	%