◆麦類赤かび病　胞子飛散状況調査

（西条市丹原町池田/松山市上難波）（気象：アメダス西条/アメダス松山）

概要：
＜3月16日から調査開始＞
気温が高く、降水量が多いと発病しやすくなります。
出穂25日後頃までが二次感染防止に有効な防除時期です。
平年は過去10ヵ年の平均値です。









2024年	西条市丹原町					松山市上難波				
	気象		飛散胞子			気象		飛散胞子		
	平均気温(℃)	降水量(mm)	飛散胞子数	半旬計	平年半旬計	平均気温(℃)	降水量(mm)	飛散胞子数	半旬計	平年半旬計
3/16	8.6	0	0			10.8	0	0		
3/17	9.2	0	0			11.0	0	0		
3/18	8.4	4.5	0			10.1	6	0		
3/19										
3/20				0	7.3				0	21.9
3/21										
3/22										
3/23										
3/24										
3/25					8.6					19.2
3/26										
3/27										
3/28										
3/29										
3/30										
3/31					11.5					17.7
4/1										
4/2										
4/3										
4/4										
4/5					17.9					28.3
4/6										
4/7										
4/8										
4/9										
4/10					30.9					30.2

2024年	西条市丹原町					松山市上難波				
	気象		飛散胞子			気象		飛散胞子		
	平均気温(℃)	降水量(mm)	飛散胞子数	半旬計	平年半旬計	平均気温(℃)	降水量(mm)	飛散胞子数	半旬計	平年半旬計
4/11										
4/12										
4/13										
4/14										
4/15					28.0					27.5
4/16										
4/17										
4/18										
4/19										
4/20					19.3					20.2
4/21										
4/22										
4/23										
4/24										
4/25					15.9					22.7
4/26										
4/27										
4/28										
4/29										
4/30					17.3					16.7

飛散胞子数調査：
・麦圃場に明日山式胞子採集器を設置し、原則毎朝調査。
・スライドグラスに付着した胞子を、面積18×18mm分カウント、2枚のスライドグラス分を合計し、飛散胞子数とした。
・調査間隔があいた場合は、日数で除し、日別値を求めた。