

貝毒プランクトン調査

調査年月日	令和8年8月17日		単位：cells/mL		9:00～
種類 / 地点番号	⑬				
	船越				
	5m水温 (°C)	29.4			
珪藻類	95				
<貝毒プランクトン>					
アレキサンドリウム属	0.008				
ギムノディニウム・カテナータム	0				
ディノフィシス属	0				
<有害プランクトン>					
カレニア・ミキモトイ	0				
コクロディニウム・ポリクリコイデス	0				
ヘテロシグマ・アカシオ	0				
シャトネラ属	0				
種類 / 地点番号					
	5m水温 (°C)				
珪藻類					
<貝毒プランクトン>					
アレキサンドリウム属					
ギムノディニウム・カテナータム					
ディノフィシス属					
<有害プランクトン>					
カレニア・ミキモトイ					
コクロディニウム・ポリクリコイデス					
ヘテロシグマ・アカシオ					
シャトネラ属					
状況	ギムノディニウム・カテナータムは確認されませんでした。 なお、岩松湾及び愛南南部地区では二枚貝の毒化が確認されていますので、採取・喫食を控えるとともに、今後の動向にご注意ください。 ※0～7m各層を等量混合し、1,000倍濃縮検鏡。 【危険濃度】 アレキサンドリウム属(麻痺性貝毒) 500cells/mL				

