

令和7年度 ノリ養殖漁場栄養塩速報 No.1

ノリ養殖漁業者・関係者 様

令和7年10月15日

愛媛県水産研究センター栽培資源研究所

水温は平年に比べ、+3.0～+3.7℃となっています。
栄養塩濃度は、5～98ガンマとなっており、西条1では50ガンマを上回っていますが、その他は下回っています。
珪藻については、大型種は確認されていません。


※壬生川1と2、禎瑞1及びひうち2については、悪天候のため、欠測です。ご迷惑をおかけいたしますが、ご理解のほどよろしくお願いいたします。

栄養塩の測定は毎週水曜日に実施しますので、測定当日午前中までに栽培資源研究所 東予駐在(東予地方局西条第2庁舎内 西条市丹原町)に持込み願います。
次回は10月22日水曜日の実施を予定しています。


地区	調査日	場所	水温		塩分 psu	NH4	NO2	NO3	PO4	DIN	窒素	珪藻密度 (細胞/ml)		
			表層	底層		μ M	μ M	μ M	μ M	μ M	ガンマ	Coscin.	Eucampia	その他
西条	10月15日	禎瑞2	26.7	26.1	31.8	1.97	0.08	0.66	0.38	2.71	38	0	0	53
	10月15日	西条1	26.0	26.3	31.5	5.37	0.18	1.44	0.80	6.99	98	0	0	44
	10月15日	西条2	26.3	25.9	32.0	—	0.03	0.32	0.23	0.34	5	0	0	5
	10月15日	ひうち1	26.2	25.9	31.8	0.39	0.06	0.79	0.23	1.24	17	0	0	1

ノリ漁場栄養塩濃度 DIN ガンマ

観測日: 令和7年10月15日 表層



ノリ養殖漁場栄養塩速報 No.1



令和7年度西条地区水温の推移

令和7年度 ノリ養殖漁場栄養塩速報 No.2

ノリ養殖漁業者・関係者 様

令和7年10月30日

愛媛県水産研究センター栽培資源研究所

水温は、西条地区のうち壬生川1、禎瑞1及び西条1では-0.2～+0.3℃と平年並みですが、その他の調査場所では+0.6～+1.9℃と平年より高めとなっています、弓削地区では10月28日現在+0.8～+1.1℃と平年より高めとなっています。

栄養塩濃度は、西条地区のうち壬生川1、禎瑞1及び西条1では111～125ガンマで50ガンマを上回っていますが、その他の調査場所では18～36ガンマとなっています。弓削地区では10月28日現在24～50ガンマとなっています。

珪藻は、西条地区では大型種のコシノディスカスとユーカンピアが確認されています。


栄養塩の測定は毎週水曜日に実施しますので、測定当日午前中までに栽培資源研究所 東予駐在(東予地方局西条第2庁舎内 西条市丹原町)に持込み願います。

次回は11月5日水曜日の実施を予定しています。


地区	調査日	場所	水温		塩分 psu	NH4	NO2	NO3	PO4	DIN	窒素	珪藻密度（細胞/ml）		
			表層	底層		μ M	μ M	μ M	μ M	μ M	ガンマ	<i>Coscino.</i>	<i>Eucampia</i>	その他
西条	10月30日	壬生川1	20.3	20.7	30.9	1.95	0.28	5.72	0.62	7.95	111	0	0	229
	10月30日	壬生川2	21.0	21.0	31.9	0.59	0.11	0.82	0.24	1.51	21	0	4	436
	10月30日	禎瑞1	20.2	20.9	30.2	3.59	0.30	5.04	0.82	8.93	125	0	0	237
	10月30日	禎瑞2	21.0	21.8	31.6	0.58	0.16	0.96	0.27	1.70	24	2	0	45
	10月30日	西条1	20.7	21.5	26.3	6.51	0.21	1.86	0.73	8.57	120	0	16	252
	10月30日	西条2	21.8	22.1	32.0	1.22	0.38	0.87	0.22	2.47	35	1	0	103
	10月30日	ひうち1	22.2	22.3	32.1	1.30	0.51	0.79	0.27	2.60	36	5	0	91
	10月30日	ひうち2	22.3	22.3	32.2	0.43	0.38	0.47	0.24	1.28	18	7	0	9
弓削	10月7日	港内	26.0	－		0.80	0.08	0.37	0.47	1.25	17			
	10月7日	豊島	26.1	－		0.41	0.05	0.26	0.32	0.71	10			
	10月7日	狩尾	26.1	－		0.24	0.06	0.18	0.30	0.48	7			
	10月7日	百貫	26.0	－		0.62	0.05	0.48	0.32	1.16	16			
	10月7日	馬立	26.1	－		0.84	0.06	1.05	0.33	1.95	27			
	10月28日	港内	23.4	－		0.26	1.36	0.66	0.41	2.28	32	0	0	7
	10月28日	豊島	23.3	－		0.29	1.33	1.98	0.42	3.59	50	0	0	7
	10月28日	狩尾	23.4	－		0.05	1.42	0.58	0.40	2.05	29	0	0	5
	10月28日	百貫	23.1	－		0.11	1.07	0.52	0.36	1.71	24	0	0	14
	10月28日	馬立	23.1	－		0.95	1.23	0.99	0.31	3.17	44	0	0	11

ノリ漁場栄養塩濃度 DIN ガンマ


観測日: 令和7年10月30日 表層



ノリ養殖漁場栄養塩速報 No.2



令和7年度西条地区水温の推移



令和7年度弓削地区水温の推移

令和7年度 ノリ養殖漁場栄養塩速報 No.3

ノリ養殖漁業者・関係者 様

令和7年11月5日

愛媛県水産研究センター栽培資源研究所


水温は、西条地区では平年比-0.2~+0.8℃、弓削地区では平年比+0.2~+0.6℃となっております。
栄養塩濃度は、西条地区のうち「ひうち2」では73ガンマで50ガンマを上回っていますが、その他の調査場所では10~42ガンマとなっています。弓削地区では12~39ガンマとなっています。
珪藻は、西条地区、弓削地区ともに大型種のコシノディスカスとユーカンピアが確認されています。

栄養塩の測定は毎週水曜日に実施しますので、測定当日午前中までに栽培資源研究所 東予駐在(東予地方局西条第2庁舎内 西条市丹原町)に持込み願います。
次回は11月12日水曜日の実施を予定しています。


地区	調査日	場所	水温		塩分 psu	NH4	NO2	NO3	PO4	DIN	DIN	珪藻密度 (細胞/ml)		
			表層	底層		μ M	μ M	μ M	μ M	μ M	ガンマ	Coscin.	Eucampia	その他
西条	11月5日	壬生川1	19.2	19.1	31.5	0.30	0.06	0.92	0.32	1.28	18	5	0	16
	11月5日	壬生川2	19.6	19.6	31.7	0.14	0.05	0.78	0.22	0.96	13	4	0	2
	11月5日	禎瑞1	20.1	20.0	31.4	1.10	0.06	0.86	0.25	2.01	28	2	2	1
	11月5日	禎瑞2	19.9	20.3	31.7	0.14	0.05	0.50	0.21	0.69	10	8	0	8
	11月5日	西条1	20.2	20.4	31.6	0.59	0.06	0.96	0.24	1.60	22	7	0	18
	11月5日	西条2	19.9	20.7	31.4	0.62	0.07	0.94	0.24	1.64	23	3	0	48
	11月5日	ひうち1	20.1	21.0	31.1	1.37	0.09	1.52	0.27	2.98	42	2	0	7
	11月5日	ひうち2	19.2	20.9	30.1	1.68	0.10	3.42	0.34	5.20	73	0	0	19
	11月4日	港内	22.0	-		0.05	0.72	0.39	0.30	1.16	16	0	0	4
	11月4日	豊島	22.0	-		0.26	0.73	0.37	0.31	1.35	19	0	2	6
	11月4日	狩尾	21.9	-		0.26	0.72	0.42	0.35	1.40	20	3	0	2
	11月4日	百貫	21.6	-		0.16	0.44	0.28	0.32	0.88	12	4	0	0
	11月4日	馬立	22.0	-		1.13	0.57	1.07	0.29	2.77	39	4	0	3

ノリ漁場栄養塩濃度 DIN ガンマ


観測日: 令和7年11月5日 表層



ノリ養殖漁場栄養塩速報 No.3



令和7年度西条地区水温の推移




令和7年度弓削地区水温の推移


地区	調査日	場所	水温		塩分	NH4	NO2	NO3	PO4	DIN	DIN	珪藻密度（細胞/ml）		
			表層	底層	psu	μ M	μ M	μ M	μ M	μ M	μ M	ガンマ	<i>Coscin</i>	<i>Eucampia</i>
西条	11月12日	壬生川1	19.3	19.3	31.9	0.16	0.06	0.58	0.21	0.81	11	1	0	245
	11月12日	壬生川2	19.5	19.5	32.0	0.26	0.08	0.80	0.20	1.13	16	0	0	178
	11月12日	禎瑞1	19.4	19.8	31.3	1.47	0.11	3.14	0.30	4.72	66	0	0	30
	11月12日	禎瑞2	19.5	20.6	31.9	0.59	0.08	0.80	0.25	1.47	21	0	0	38
	11月12日	西条1	20.1	20.3	31.8	1.78	0.12	1.46	0.35	3.35	47	0	0	19
	11月12日	西条2	19.1	20.4	31.2	2.63	0.11	1.34	0.44	4.08	57	0	0	14
	11月12日	ひうち1	19.6	20.32	31.1	0.80	0.12	1.27	0.27	2.19	31	0	0	49
	11月12日	ひうち2	19.5	20.1	31.4	1.24	0.12	0.92	0.31	2.28	32	0	0	31
弓削	11月10日	港内	21.1	—		0.19	0.52	0.32	0.37	1.03	14	0	0	2
	11月10日	豊島	21.4	—		0.75	0.81	0.42	0.22	1.98	28	0	0	10
	11月10日	狩尾	21.0	—		0.33	0.60	0.24	0.31	1.17	16	1	0	2
	11月10日	百貫	21.1	—		1.73	0.56	0.38	0.14	2.67	37	4	0	5
	11月10日	馬立	21.2	—		0.97	0.62	0.42	0.18	2.01	28	2	0	2
志津見 （大島）	11月10日	泊	—	—		0.41	1.08	3.33	0.43	4.82	67			

ノリ漁場栄養塩濃度 DIN ガンマ


観測日: 令和7年11月12日 表層



ノリ養殖漁場栄養塩速報 No.4



令和7年度西条地区水温の推移



令和7年度弓削地区水温の推移

令和7年度 ノリ養殖漁場栄養塩速報 No.5

ノリ養殖漁業者・関係者 様

令和7年11月19日

愛媛県水産研究センター栽培資源研究所

水温は、西条地区では平年比+0.8～+2.3℃、弓削地区では平年比+0.4～+0.9℃となっております。
 栄養塩濃度は、西条地区の「禎瑞1」、「禎瑞2」、「西条1」、「西条2」、「ひうち1」と志津見地区の「泊」は56～110ガンマで50ガンマを上回っていますが、その他の調査場所では25～40ガンマとなっています。
 珪藻は、大型種は確認されませんでした。西条地区では「ひうち1」以外の場所で小型種が多数確認されています。


栄養塩の測定は毎週水曜日に実施しますので、測定当日午前中までに栽培資源研究所 東予駐在(東予地方局西条第2庁舎内 西条市丹原町)に持込み願います。

次回は11月26日水曜日の実施を予定しています。


地区	調査日	場所	水温		塩分	NH4	NO2	NO3	PO4	DIN	DIN	珪藻密度（細胞/ml）		
			表層	底層	psu	μ M	μ M	μ M	μ M	μ M	μ M	ガンマ	<i>Coscin.</i>	<i>Eucampia</i>
西条	11月19日	壬生川1	18.0	18.1	31.8	0.44	0.27	2.02	0.43	2.74	38	0	0	1155
	11月19日	壬生川2	18.2	17.9	32.0	0.67	0.25	1.21	0.36	2.12	30	0	0	362
	11月19日	禎瑞1	17.5	17.6	31.6	5.41	0.30	2.16	0.72	7.87	110	0	0	124
	11月19日	禎瑞2	19.0	18.6	31.6	3.40	0.30	1.69	0.56	5.39	75	0	0	252
	11月19日	西条1	17.4	17.9	31.0	4.08	0.30	2.94	0.64	7.32	102	0	0	652
	11月19日	西条2	18.5	18.7	31.6	2.54	0.27	1.30	0.47	4.11	57	0	0	96
	11月19日	ひうち1	18.4	18.5	31.6	2.56	0.27	1.16	0.47	3.99	56	0	0	12
	11月19日	ひうち2	18.6	18.5	31.9	1.63	0.25	0.76	0.40	2.65	37	0	0	176
弓削	11月18日	港内	20.5	－		－	1.65	0.50	0.59	2.16	30	0	0	2
	11月18日	豊島	20.4	－		0.22	1.69	0.63	0.63	2.54	36	0	0	0
	11月18日	狩尾	20.5	－		0.56	1.68	0.60	0.68	2.84	40	0	0	1
	11月18日	百貫	20.0	－		0.39	1.01	0.39	0.56	1.79	25	0	0	0
	11月18日	馬立	20.4	－		1.02	1.02	0.53	0.54	2.58	36	0	0	2
志津見 （大島）	11月18日	泊	－	－		－	1.95	2.43	0.64	4.39	61			

ノリ漁場栄養塩濃度 DIN ガンマ


観測日: 令和7年11月19日 表層



ノリ養殖漁場栄養塩速報 No.5



令和7年度西条地区水温の推移



令和7年度弓削地区水温の推移

令和7年度 ノリ養殖漁場栄養塩速報 No.6

ノリ養殖漁業者・関係者 様

令和7年11月26日

愛媛県水産研究センター栽培資源研究所


水温は、西条地区では平年比+0.6～+1.5℃、弓削地区では平年比±0.0～+0.8℃となっております。
栄養塩濃度は、弓削地区「馬立」と志津見地区「志津見」では50ガンマを上回っていますが、その他の調査場所では3～49ガンマとなっています。
珪藻は、大型種は確認されませんでした、西条地区では小型種が多数確認されています。

栄養塩の測定は毎週水曜日に実施しますので、測定当日午前中までに栽培資源研究所 東予駐在(東予地方局西条第2庁舎内 西条市丹原町)に持込み願います。
次回は12月3日水曜日の実施を予定しています。


地区	調査日	場所	水温		塩分 psu	NH4	NO2	NO3	PO4	DIN	DIN	珪藻密度 (細胞/ml)		
			表層	底層		μ M	μ M	μ M	μ M	μ M	ガンマ	Coscin.	Eucampia	その他
西条	11月26日	壬生川1	16.6	16.3	32.0	－	0.04	0.28	0.22	0.33	5	0	0	3335
	11月26日	壬生川2	16.8	16.7	32.1	0.05	0.05	0.21	0.14	0.31	4	0	0	2334
	11月26日	禎瑞1	16.9	16.8	31.9	0.21	0.08	1.24	0.14	1.53	21	0	0	4905
	11月26日	禎瑞2	17.1	17.1	32.3	0.06	0.04	0.14	0.13	0.24	3	0	0	4430
	11月26日	西条1	16.6	16.5	31.9	0.23	0.10	1.02	0.14	1.36	19	0	0	3630
	11月26日	西条2	17.2	17.5	32.0	－	0.11	0.26	0.15	0.37	5	0	0	3310
	11月26日	ひうち1	17.5	17.5	32.0	0.87	0.18	1.00	0.24	2.06	29	0	0	3005
	11月26日	ひうち2	16.9	17.7	31.5	1.67	0.18	1.63	0.30	3.48	49	0	0	2940
弓削	11月25日	港内	19.5	－	/	0.78	1.62	1.03	0.46	3.43	48	0	0	10
	11月25日	豊島	19.4	－		0.33	1.22	0.68	0.40	2.23	31	0	0	3
	11月25日	狩尾	19.3	－		0.68	1.41	0.92	0.44	3.00	42	0	0	4
	11月25日	百貫	18.7	－		0.76	0.37	0.45	0.32	1.58	22	0	0	8
	11月25日	馬立	19.4	－		1.68	1.11	0.95	0.31	3.73	52	0	0	4
志津見 (大島)	11月25日	志津見	－	－	/	0.14	1.52	3.16	0.48	4.82	67	/		
宮窪 (大島)	11月25日	四阪	－	－		0.66	1.31	0.70	0.56	2.67	37			

ノリ漁場栄養塩濃度 DIN ガンマ


観測日: 令和7年11月26日 表層



ノリ養殖漁場栄養塩速報 No.6



令和7年度西条地区水温の推移



令和7年度弓削地区水温の推移

令和7年度 ノリ養殖漁場栄養塩速報 No.7

ノリ養殖漁業者・関係者 様

令和7年12月4日

愛媛県水産研究センター栽培資源研究所

水温は、西条地区では平年比+1.0～+2.6℃、弓削地区では平年比+0.9～+1.4℃となっております。
栄養塩濃度は、弓削地区「港内」、「狩尾」、「百貫」、志津見地区「志津見」では50ガンマを上回っていますが、その他の調査場所では19～47ガンマとなっています。
珪藻類については、大型種は確認されていません。


※壬生川1と2については、悪天候のため、欠測です。ご迷惑をおかけいたしますが、ご理解のほどよろしくお願いいたします。

栄養塩の測定は毎週水曜日に実施しますので、測定当日午前中までに栽培資源研究所 東予駐在（東予地方局西条第2庁舎内 西条市丹原町）に持込み願います。
次回は12月10日水曜日の実施を予定しています。


地区	調査日	場所	水温		塩分 psu	NH4	NO2	NO3	PO4	DIN	DIN	珪藻密度（細胞/ml）		
			表層	底層		μ M	μ M	μ M	μ M	μ M	ガンマ	Coscin.	Eucampia	その他
西条	12月4日	禎瑞1	15.6	15.8	32.5	0.90	0.19	1.17	0.31	2.25	32	0	0	96
	12月4日	禎瑞2	17.2	17.2	32.8	0.24	0.64	0.50	0.36	1.37	19	0	0	38
	12月4日	西条1	15.8	15.8	32.7	0.73	0.28	0.62	0.28	1.63	23	0	0	184
	12月4日	西条2	17.0	17.0	32.5	0.30	0.62	0.47	0.34	1.39	19	0	0	114
	12月4日	ひうち1	15.8	16.1	32.2	1.27	0.11	1.04	0.28	2.43	34	0	0	134
	12月4日	ひうち2	16.1	16.7	32.5	0.91	0.25	0.41	0.29	1.57	22	0	0	32
弓削	12月2日	港内	19.0	－		1.30	1.74	1.22	0.35	4.26	60	0	0	2
	12月2日	豊島	19.0	－		0.13	1.63	1.58	0.25	3.34	47	0	0	6
	12月2日	狩尾	19.0	－		0.59	1.85	1.38	0.36	3.82	53	0	0	1
	12月2日	百貫	18.5	－		3.77	1.31	1.60	0.12	6.68	94	0	0	1
	12月2日	馬立	18.6	－		0.71	1.35	1.32	0.39	3.39	47	0	0	8
志津見 （大島）	12月1日	志津見	－	－		1.20	1.70	1.16	0.63	4.06	57			
宮窪 （大島）	12月1日	四阪	－	－		－	1.44	0.79	0.45	2.22	31			

ノリ漁場栄養塩濃度 DIN ガンマ


観測日: 令和7年12月4日 表層



ノリ養殖漁場栄養塩速報 No.7



令和7年度西条地区水温の推移



令和7年度弓削地区水温の推移

令和7年度 ノリ養殖漁場栄養塩速報 No.8

ノリ養殖漁業者・関係者 様

令和7年12月10日

愛媛県水産研究センター栽培資源研究所


水温は、西条地区では平年比-1.8~+2.1℃、弓削地区では平年比+0.6~+0.8℃となっております。
栄養塩濃度は、西条地区「壬生川2」、「ひうち2」、弓削地区「馬立」、志津見地区「志津見」、宮窪地区「四阪」では50ガンマを下回っていますが、その他の調査場所では56~516ガンマとなっています。
珪藻類については、大型種は確認されていません。

栄養塩の測定は毎週水曜日に実施しますので、測定当日午前中までに栽培資源研究所 東予駐在(東予地方局西条第2庁舎内 西条市丹原町)に持込み願います。
次回は12月17日水曜日の実施を予定しています。


地区	調査日	場所	水温		塩分 psu	NH4	NO2	NO3	PO4	DIN	DIN	珪藻密度 (細胞/ml)		
			表層	底層		μ M	μ M	μ M	μ M	μ M	ガンマ	Coscin.	Eucampia	その他
西条	12月10日	壬生川1	14.3	14.7	32.3	1.01	0.38	2.98	0.43	4.37	61	0	0	591
	12月10日	壬生川2	15.3	15.4	32.6	0.40	0.44	1.60	0.33	2.44	34	0	0	520
	12月10日	禎瑞1	11.9	13.4	31.5	6.92	0.36	3.70	0.77	10.98	154	0	0	50
	12月10日	禎瑞2	14.8	14.9	32.5	2.25	0.36	1.38	0.37	3.99	56	0	0	246
	12月10日	西条1	13.6	14.2	31.6	27.34	0.40	9.13	0.89	36.87	516	0	0	106
	12月10日	西条2	15.2	15.5	32.7	4.44	0.43	1.01	0.67	5.88	82	0	0	338
	12月10日	ひうち1	14.6	14.9	32.6	2.82	0.34	1.40	0.33	4.56	64	0	0	520
	12月10日	ひうち2	15.8	15.9	32.8	0.67	0.60	0.93	0.34	2.19	31	0	0	152
弓削	12月9日	港内	17.5	-		1.19	1.72	1.65	0.53	4.56	64	0	0	10
	12月9日	豊島	17.5	-		1.44	1.67	2.13	0.44	5.25	73	0	0	0
	12月9日	狩尾	17.6	-		2.12	1.78	2.48	0.47	6.37	89	0	0	0
	12月9日	百貫	17.3	-		1.24	1.54	1.90	0.43	4.68	66	0	0	0
	12月9日	馬立	17.3	-		0.00	1.62	1.71	0.49	3.34	47	0	0	14
志津見 (大島)	12月9日	志津見	-	-		-	1.68	1.54	0.52	3.22	45			
宮窪 (大島)	12月9日	四阪	-	-		0.13	1.26	1.07	0.46	2.45	34			

ノリ漁場栄養塩濃度 DIN ガンマ


観測日: 令和7年12月10日 表層



ノリ養殖漁場栄養塩速報 No.8



令和7年度西条地区水温の推移



令和7年度弓削地区水温の推移

令和7年度 ノリ養殖漁場栄養塩速報 No.9

ノリ養殖漁業者・関係者 様

令和7年12月16日

愛媛県水産研究センター栽培資源研究所


水温は、西条地区では平年比+0.1～+1.1℃、弓削地区では平年比+0.5～+0.9℃となっております。
栄養塩濃度は、西条地区「禎瑞1」、弓削地区「豊島」、「狩尾」、志津見地区「志津見」では50ガンマを上回っていますが、その他の調査場所では4～48ガンマとなっています。
珪藻類については、大型種は確認されていません。

栄養塩の測定は毎週水曜日に実施しますので、測定当日午前中までに栽培資源研究所 東予駐在（東予地方局西条第2庁舎内 西条市丹原町）に持込み願います。
次回は12月24日水曜日の実施を予定しています。


地区	調査日	場所	水温		塩分 psu	NH4	NO2	NO3	PO4	DIN	DIN	珪藻密度（細胞/ml）		
			表層	底層		μ M	μ M	μ M	μ M	μ M	ガンマ	Coscin.	Eucampia	その他
西条	12月16日	壬生川1	14.0	14.0	32.7	0.01	0.05	0.21	0.37	0.27	4	0	0	412
	12月16日	壬生川2	14.1	14.5	32.7	0.07	0.17	1.08	0.34	1.32	18	0	0	350
	12月16日	禎瑞1	13.3	13.4	31.2	1.65	0.09	2.81	0.44	4.54	64	0	0	0
	12月16日	禎瑞2	13.6	14.5	32.6	2.28	0.04	0.17	0.25	2.49	35	0	0	292
	12月16日	西条1	13.7	13.7	32.4	2.65	0.08	0.24	0.25	2.97	42	0	0	812
	12月16日	西条2	14.2	14.6	32.7	0.35	0.31	0.72	0.22	1.38	19	0	0	958
	12月16日	ひうち1	14.3	14.1	32.6	0.31	0.37	1.17	0.24	1.86	26	0	0	688
	12月16日	ひうち2	14.0	14.4	32.7	0.28	0.17	0.38	0.22	0.83	12	0	0	348
弓削	12月16日	港内	16.7	-		0.10	1.59	1.71	0.51	3.40	48	0	0	0
	12月16日	豊島	16.6	-		0.19	1.64	1.92	0.52	3.75	52	0	0	0
	12月16日	狩尾	16.7	-		0.52	1.57	1.64	0.59	3.73	52	0	0	0
	12月16日	百貫	16.3	-		0.26	1.36	1.38	0.50	3.00	42	0	0	0
	12月16日	馬立	16.4	-		0.24	1.23	1.57	0.48	3.04	42	0	0	26
志津見 （大島）	12月16日	志津見	-	-		0.16	1.72	1.75	1.13	3.63	51			
宮窪 （大島）	12月16日	四阪	-	-		0.01	1.50	1.06	0.56	2.56	36			

ノリ漁場栄養塩濃度 DIN ガンマ


観測日: 令和7年12月16日 表層



ノリ養殖漁場栄養塩速報 No.9



令和7年度西条地区水温の推移



令和7年度弓削地区水温の推移

令和7年度 ノリ養殖漁場栄養塩速報 No.10

ノリ養殖漁業者・関係者 様

令和7年12月24日

愛媛県水産研究センター栽培資源研究所


水温は、西条地区では平年比+0.4～+2.4℃、弓削地区では平年比+0.6～+1.3℃となっております。
栄養塩濃度は、西条地区「西条1」、弓削地区「豊島」、「狩尾」、「馬立」では50ガンマを上回っていますが、その他の調査場所では12～47ガンマとなっています。
珪藻類は、西条地区において大型種のコシノディスカスとユーカンピアが確認されています。

栄養塩の測定は毎週水曜日に実施しますので、測定当日午前中までに栽培資源研究所 東予駐在(東予地方局西条第2庁舎内 西条市丹原町)に持込み願います。
次回は1月7日水曜日の実施を予定しています。


地区	調査日	場所	水温		塩分 psu	NH4	NO2	NO3	PO4	DIN	DIN	珪藻密度 (細胞/mL)		
			表層	底層		μ M	μ M	μ M	μ M	μ M	ガンマ	Coscin.	Eucampia	その他
西条	12月24日	壬生川1	13.5	13.5	32.7	0.74	0.19	0.75	0.32	1.68	23	0	0	238
	12月24日	壬生川2	14.0	14.1	32.7	0.53	0.16	0.76	0.23	1.45	20	1	0	786
	12月24日	禎瑞1	14.0	14.0	32.6	1.62	0.17	1.05	0.32	2.84	40	0	2	140
	12月24日	禎瑞2	14.1	14.3	32.7	0.50	0.13	0.24	0.23	0.87	12	1	0	164
	12月24日	西条1	12.7	14.0	31.4	2.93	0.20	3.38	0.56	6.52	91	0	0	80
	12月24日	西条2	14.4	14.9	32.7	0.72	0.27	0.65	0.26	1.64	23	1	0	58
	12月24日	ひうち1	14.8	14.5	32.7	0.45	0.23	0.62	0.26	1.30	18	0	0	240
	12月24日	ひうち2	14.0	14.6	32.3	0.48	0.23	0.92	0.26	1.63	23	0	0	164
弓削	12月23日	港内	16.0	—	/	0.11	1.58	1.70	0.51	3.39	47	0	0	6
	12月23日	豊島	16.1	—		0.70	1.57	1.79	0.49	4.05	57	0	0	0
	12月23日	狩尾	16.1	—		0.39	1.61	1.68	0.52	3.68	52	0	0	0
	12月23日	百貫	15.4	—		0.23	1.10	1.49	0.48	2.81	39	0	0	8
	12月23日	馬立	15.6	—		1.77	1.29	2.18	0.25	5.24	73	0	0	1

ノリ漁場栄養塩濃度 DIN ガンマ


観測日: 令和7年12月24日 表層



ノリ養殖漁場栄養塩速報 No.10



令和7年度西条地区水温の推移



令和7年度弓削地区水温の推移

令和7年度 ノリ養殖漁場栄養塩速報 No.11

ノリ養殖漁業者・関係者 様

令和8年1月7日

愛媛県水産研究センター栽培資源研究所

水温は、西条地区では平年比+0.9～+2.4℃、弓削地区では1月6日現在、平年比+0.7～+1.1℃となっております。
 栄養塩濃度は、志津見(大島)地区「志津見」では50ガンマを上回っていますが、西条地区では1～4ガンマとなっており、弓削地区では1月6日現在26～41ガンマとなっています。
 珪藻類は、大型種のコシノディスカスが確認されており、西条地区では小型種も多数確認されています。


栄養塩の測定は毎週水曜日に実施しますので、測定当日午前中までに栽培資源研究所 東予駐在(東予地方局西条第2庁舎内 西条市丹原町)に持込み願います。

次回は1月14日水曜日の実施を予定しています。


地区	調査日	場所	水温		塩分 psu	NH4	NO2	NO3	PO4	DIN	DIN	珪藻密度 (細胞/mL)		
			表層	底層		μ M	μ M	μ M	μ M	μ M	ガンマ	Coscin.	Eucampia	その他
西条	1月7日	壬生川1	12.1	11.8	33.1	0.01	0.03	0.13	0.21	0.18	3	0	0	1315
	1月7日	壬生川2	11.8	11.9	33.0	—	0.02	0.06	0.15	0.09	1	1	0	1655
	1月7日	禎瑞1	11.9	11.9	33.0	—	0.03	0.10	0.20	0.13	2	0	0	1785
	1月7日	禎瑞2	13.2	12.9	33.1	0.03	0.12	0.08	0.29	0.23	3	2	0	1091
	1月7日	西条1	11.7	10.9	32.8	0.08	0.08	0.14	0.23	0.30	4	0	0	990
	1月7日	西条2	12.4	12.5	33.1	0.17	0.05	0.05	0.20	0.26	4	1	0	726
	1月7日	ひうち1	12.1	12.3	32.9	0.04	0.05	0.12	0.15	0.21	3	0	0	208
	1月7日	ひうち2	12.3	12.5	33.0	0.05	0.08	0.09	0.18	0.23	3	1	0	624
弓削	12月30日	港内	15.5	—		0.26	1.05	1.66	0.47	2.97	42			
	12月30日	豊島	15.4	—		0.32	0.89	1.50	0.41	2.71	38			
	12月30日	狩尾	15.5	—		0.26	1.26	1.90	0.55	3.42	48			
	12月30日	百貫	15.1	—		0.28	0.86	1.33	0.46	2.47	35			
	12月30日	馬立	15.3	—		0.35	0.74	1.55	0.48	2.64	37			
	1月6日	港内	14.3	—		1.05	0.64	1.13	0.49	2.82	39	0	0	75
	1月6日	豊島	14.3	—		0.90	0.75	1.29	0.50	2.94	41	0	0	39
	1月6日	狩尾	14.2	—		0.39	0.56	0.93	0.45	1.88	26	2	0	75
	1月6日	百貫	13.9	—		0.79	0.47	1.20	0.47	2.46	34	0	0	66
	1月6日	馬立	14.0	—		0.46	0.53	1.43	0.47	2.42	34	0	0	83
志津見 (大島)	1月6日	志津見	—	—		0.51	1.15	2.62	0.55	4.28	60			
宮窪 (大島)	1月6日	四阪	—	—		0.12	0.72	1.19	0.46	2.02	28			

ノリ漁場栄養塩濃度 DIN ガンマ


観測日: 令和8年1月7日 表層



ノリ養殖漁場栄養塩速報 No.11



令和7年度西条地区水温の推移



令和7年度弓削地区水温の推移

令和7年度 ノリ養殖漁場栄養塩速報 No.12

ノリ養殖漁業者・関係者 様

令和8年1月15日

愛媛県水産研究センター栽培資源研究所

水温は、西条地区では平年比+0.8～+2.5℃、弓削地区では平年比+0.7～+1.1℃となっております。
栄養塩濃度は、西条地区「禎瑞1」と志津見地区「志津見」では50ガンマを上回っていますが、その他の調査場所では1～26ガンマとなっています。
珪藻類は、西条地区、弓削地区ともに大型種のコシノディスカスが確認されており、小型種も多数確認されています。


栄養塩の測定は毎週水曜日に実施しますので、測定当日午前中までに栽培資源研究所 東予駐在(東予地方局西条第2庁舎内 西条市丹原町)に持込み願います。

次回は1月21日水曜日の実施を予定しています。


地区	調査日	場所	水温		塩分 psu	NH4	NO2	NO3	PO4	DIN	DIN	珪藻密度 (細胞/mL)		
			表層	底層		μ M	μ M	μ M	μ M	μ M	ガンマ	Coscin.	Eucampia	その他
西条	1月15日	壬生川1	11.2	11.5	33.1	0.03	0.04	0.33	0.24	0.40	6	0	0	142
	1月15日	壬生川2	12.5	11.8	33.4	—	0.11	0.10	0.33	0.21	3	2	0	310
	1月15日	禎瑞1	11.5	11.5	33.2	0.31	0.11	4.04	0.35	4.46	62	0	0	496
	1月15日	禎瑞2	11.9	12.1	33.1	0.00	0.03	0.02	0.18	0.05	1	0	0	324
	1月15日	西条1	11.2	11.3	33.1	0.07	0.03	0.04	0.15	0.14	2	2	0	1825
	1月15日	西条2	12.4	12.2	33.5	0.13	0.04	—	0.28	0.17	2	0	0	506
	1月15日	ひうち1	11.5	11.9	33.0	0.12	0.15	0.13	0.22	0.41	6	0	0	208
	1月15日	ひうち2	10.9	12.1	32.7	0.60	0.26	0.27	0.27	1.13	16	0	0	374
弓削	1月14日	港内	13.5	—		0.22	0.47	0.85	0.40	1.53	21	0	0	64
	1月14日	豊島	13.5	—		0.22	0.48	0.82	0.40	1.52	21	1	0	139
	1月14日	狩尾	13.4	—		0.05	0.38	0.58	0.38	1.01	14	0	0	118
	1月14日	百貫	13.2	—		0.05	0.34	0.66	0.39	1.06	15	0	0	86
	1月14日	馬立	13.1	—		0.18	0.20	0.30	0.33	0.68	9	0	0	290
志津見 (大島)	1月6日	志津見	—	—		—	1.15	2.71	0.44	3.87	54			
宮窪 (大島)	1月6日	四阪	—	—		—	0.67	1.22	0.56	1.89	26			

ノリ漁場栄養塩濃度 DIN ガンマ


観測日: 令和8年1月15日 表層



ノリ養殖漁場栄養塩速報 No.12



令和7年度西条地区水温の推移



令和7年度弓削地区水温の推移

令和7年度 ノリ養殖漁場栄養塩速報 No.13

ノリ養殖漁業者・関係者 様

令和8年1月21日

愛媛県水産研究センター栽培資源研究所


水温は、西条地区では平年比+1.3～+2.1℃、弓削地区では平年比+1.4～+1.5℃となっております。
栄養塩濃度は、全ての調査場所で50ガンマを下回っており、3～37ガンマとなっています。
珪藻類は、西条地区、弓削地区ともに大型種のコシノディスカスが確認されており、小型種も多数確認されています。

栄養塩の測定は毎週水曜日に実施しますので、測定当日午前中までに栽培資源研究所 東予駐在（東予地方局西条第2庁舎内 西条市丹原町）に持込み願います。
次回は1月28日水曜日の実施を予定しています。


地区	調査日	場所	水温		塩分 psu	NH4	NO2	NO3	PO4	DIN	DIN	珪藻密度（細胞/mL）		
			表層	底層		μ M	μ M	μ M	μ M	μ M	ガンマ	Coscin.	Eucampia	その他
西条	1月21日	壬生川1	11.3	11.2	33.0	0.33	0.03	0.24	0.26	0.60	8	1	0	975
	1月21日	壬生川2	11.9	11.8	33.0	0.36	0.01	0.06	0.22	0.43	6	0	0	660
	1月21日	禎瑞1	11.6	11.5	32.9	0.72	0.05	0.29	0.31	1.06	15	0	0	705
	1月21日	禎瑞2	12.0	12.2	33.1	0.13	0.01	0.05	0.22	0.19	3	0	0	424
	1月21日	西条1	11.4	11.1	32.7	0.82	0.07	0.49	0.43	1.37	19	0	0	217
	1月21日	西条2	11.9	12.2	33.1	0.68	0.02	0.11	0.17	0.80	11	0	0	166
	1月21日	ひうち1	12.0	12.1	33.1	2.17	0.06	0.45	0.13	2.68	37	0	0	596
	1月21日	ひうち2	12.1	12.2	33.0	1.73	0.05	0.37	0.15	2.15	30	0	0	380
弓削	1月20日	港内	13.5	-		0.49	0.29	0.56	0.34	1.34	19	0	0	122
	1月20日	豊島	13.5	-		0.35	0.30	0.52	0.35	1.17	16	0	0	102
	1月20日	狩尾	13.5	-		0.22	0.28	0.56	0.35	1.06	15	0	0	102
	1月20日	百貫	13.4	-		0.11	0.09	0.16	0.29	0.35	5	0	0	266
	1月20日	馬立	13.4	-		1.01	0.07	0.52	0.33	1.59	22	2	0	164
志津見 （大島）	1月6日	志津見	-	-		-	0.46	0.69	0.39	1.15	16			

ノリ漁場栄養塩濃度 DIN ガンマ


観測日: 令和8年1月21日 表層



ノリ養殖漁場栄養塩速報 No.13



令和7年度西条地区水温の推移



令和7年度弓削地区水温の推移

令和7年度 ノリ養殖漁場栄養塩速報 No.14

ノリ養殖漁業者・関係者 様

令和8年1月28日

愛媛県水産研究センター栽培資源研究所


水温は、西条地区では平年比+0.5～+1.8℃、弓削地区では平年比+1.0～+1.2℃となっております。
栄養塩濃度は、西条地区「西条1」では50ガンマを上回っていますが、その他の調査場所では1～22ガンマとなっています。
珪藻類は、西条地区、弓削地区ともに大型種のコシノディスカスが確認されています。

栄養塩の測定は毎週水曜日に実施しますので、測定当日午前中までに栽培資源研究所 東予駐在(東予地方局西条第2庁舎内 西条市丹原町)に持込み願います。
次回は2月4日水曜日の実施を予定しています。


地区	調査日	場所	水温		塩分 psu	NH4	NO2	NO3	PO4	DIN	DIN	珪藻密度 (細胞/mL)		
			表層	底層		μ M	μ M	μ M	μ M	μ M	ガンマ	Coscin.	Eucampia	その他
西条	1月28日	壬生川1	10.7	10.8	33.3	0.59	0.03	0.31	0.30	0.94	13	0	0	206
	1月28日	壬生川2	10.8	11.1	33.3	0.21	0.03	0.19	0.26	0.42	6	0	0	334
	1月28日	禎瑞1	10.2	10.2	32.9	0.80	0.04	0.73	0.35	1.57	22	0	0	70
	1月28日	禎瑞2	11.3	11.3	33.6	0.07	0.03	0.07	0.28	0.16	2	0	0	36
	1月28日	西条1	10.3	10.8	32.4	11.90	4.31	1.80	1.83	18.00	252	0	0	64
	1月28日	西条2	10.1	10.5	33.1	0.30	0.07	0.17	0.27	0.54	8	0	0	118
	1月28日	ひうち1	10.2	10.9	33.2	0.10	0.06	0.19	0.24	0.35	5	1	0	164
	1月28日	ひうち2	10.0	10.6	33.2	0.04	0.05	0.09	0.22	0.18	3	0	0	122
弓削	1月27日	港内	12.6	-		0.10	0.14	0.19	0.35	0.43	6	3	0	6
	1月27日	豊島	12.5	-		0.51	0.15	0.31	0.34	0.96	13	2	0	42
	1月27日	狩尾	12.4	-		0.29	0.14	0.49	0.36	0.92	13	2	0	156
	1月27日	百貫	12.4	-		0.06	0.03	0.16	0.29	0.24	3	1	0	140
	1月27日	馬立	12.5	-		0.01	0.05	0.13	0.29	0.19	3	3	0	46
宮窪 (大島)	1月27日	四阪	-	-		0.02	0.02	0.05	0.94	0.09	1			

ノリ漁場栄養塩濃度 DIN ガンマ


観測日: 令和8年1月28日 表層



ノリ養殖漁場栄養塩速報 No.14



令和7年度西条地区水温の推移



令和7年度弓削地区水温の推移

令和7年度 ノリ養殖漁場栄養塩速報 No.15

ノリ養殖漁業者・関係者 様

令和8年2月4日

愛媛県水産研究センター栽培資源研究所


水温は、西条地区では平年比-0.6～+1.8℃、弓削地区では平年比+0.9～+1.0℃となっております。
栄養塩濃度は、1～37ガンマとなっています。
珪藻類については、大型種は確認されていません。

栄養塩の測定は毎週水曜日に実施しますので、測定当日午前中までに栽培資源研究所 東予駐在(東予地方局西条第2庁舎内 西条市丹原町)に持込み願います。
次回は2月9日月曜日の実施を予定しています。


地区	調査日	場所	水温		塩分 psu	NH4	NO2	NO3	PO4	DIN	DIN	珪藻密度 (細胞/mL)		
			表層	底層		μ M	μ M	μ M	μ M	μ M	ガンマ	Coscin.	Eucampia	その他
西条	2月4日	壬生川1	9.7	9.7	33.4	0.17	0.03	0.20	0.30	0.40	6	0	0	46
	2月4日	壬生川2	10.5	10.5	33.5	0.10	0.03	0.15	0.30	0.28	4	0	0	50
	2月4日	禎瑞1	10.3	10.3	33.4	0.15	0.02	0.11	0.27	0.28	4	0	0	150
	2月4日	禎瑞2	10.8	10.8	33.5	0.21	0.02	0.34	0.31	0.57	8	0	0	58
	2月4日	西条1	8.7	9.2	32.5	0.94	0.05	1.67	0.44	2.66	37	0	0	6
	2月4日	西条2	11.2	10.8	33.6	0.17	0.02	0.00	0.29	0.18	3	0	0	18
	2月4日	ひうち1	10.1	10.2	33.3	0.20	0.03	0.17	0.25	0.40	6	0	0	16
	2月4日	ひうち2	10.6	10.3	33.4	0.16	0.03	0.02	0.20	0.20	3	0	0	66
弓削	2月3日	港内	12.0	-		0.53	0.03	0.18	0.32	0.74	10	0	0	78
	2月3日	豊島	12.0	-		0.38	0.06	0.07	0.35	0.51	7	0	0	72
	2月3日	狩尾	12.0	-		0.29	0.04	0.02	0.34	0.34	5	0	0	10
	2月3日	百貫	11.9	-		0.28	0.04	0.10	0.30	0.43	6	0	0	32
	2月3日	馬立	11.9	-		0.25	0.04	0.10	0.30	0.39	5	0	0	50
志津見 (大島)	2月3日	志津見	-	-		0.09	0.31	0.39	0.39	0.79	11			
宮窪 (大島)	2月3日	四阪	-	-		-	0.04	0.02	0.36	0.06	1			

ノリ漁場栄養塩濃度 DIN ガンマ


観測日: 令和8年2月4日 表層



ノリ養殖漁場栄養塩速報 No.15



令和7年度西条地区水温の推移



令和7年度弓削地区水温の推移

令和7年度 ノリ養殖漁場栄養塩速報 No.16

ノリ養殖漁業者・関係者 様

令和8年2月9日

愛媛県水産研究センター栽培資源研究所


水温は、平年比-1.2～+1.2℃となっております。
栄養塩濃度は、「西条1」では50ガンマを上回っていますが、その他の調査場所では2～35ガンマとなっております。
珪藻類については、「ひうち1」において大型種のユーカンピアが確認されています。

栄養塩の測定は毎週水曜日に実施しますので、測定当日午前中までに栽培資源研究所 東予駐在(東予地方局西条第2庁舎内 西条市丹原町)に持込み願います。
次回は2月18日水曜日の実施を予定しています。


地区	調査日	場所	水温		塩分 psu	NH4	NO2	NO3	PO4	DIN	DIN	珪藻密度 (細胞/mL)		
			表層	底層		μ M	μ M	μ M	μ M	μ M	ガンマ	Coscin.	Eucampia	その他
西条	2月9日	壬生川1	8.5	8.7	33.1	0.56	0.21	1.75	0.53	2.52	35	0	0	56
	2月9日	壬生川2	10.1	10.4	33.5	0.10	0.17	0.09	0.37	0.36	5	0	0	78
	2月9日	禎瑞1	10.4	9.2	33.3	0.18	0.16	0.19	0.37	0.52	7	0	0	38
	2月9日	禎瑞2	10.5	10.5	33.6	0.03	0.14	-	0.40	0.17	2	0	0	104
	2月9日	西条1	8.1	9.0	33.1	9.28	0.59	0.60	0.58	10.47	147	0	0	6
	2月9日	西条2	9.9	10.5	33.3	0.29	0.15	0.13	0.35	0.58	8	0	0	20
	2月9日	ひうち1	10.0	10.0	33.5	0.13	0.15	0.05	0.34	0.33	5	0	76	34
	2月9日	ひうち2	9.9	10.2	33.4	0.35	0.16	0.02	0.28	0.52	7	0	0	109

ノリ漁場栄養塩濃度 DIN ガンマ

観測日: 令和8年2月9日 表層



ノリ養殖漁場栄養塩速報 No.16



令和7年度西条地区水温の推移

令和7年度 ノリ養殖漁場栄養塩速報 No.17

ノリ養殖漁業者・関係者 様

令和8年2月18日

愛媛県水産研究センター栽培資源研究所

水温は、西条地区では2月18日現在平年比+1.0～+1.4℃、弓削地区では2月17日現在、平年比+0.5～+0.9℃となっております。

栄養塩濃度は、西条地区では2月18日現在2～34ガンマとなっており、弓削地区では2月17日現在6～12ガンマとなっております。

珪藻類については、「壬生川1」において大型種のユーカンピアが確認されています。

栄養塩の測定は毎週水曜日に実施しますので、測定当日午前中までに栽培資源研究所 東予駐在(東予地方局西条第2庁舎内 西条市丹原町)に持込み願います。


次回は2月25日水曜日の実施を予定しています。

地区	調査日	場所	水温		塩分 psu	NH4	NO2	NO3	PO4	DIN	DIN	珪藻密度 (細胞/mL)		
			表層	底層		μ M	μ M	μ M	μ M	μ M	ガンマ	Coscin.	Eucampia	その他
西条	2月18日	壬生川1	10.5	10.5	33.3	2.26	0.04	0.14	0.43	2.44	34	0	32	60
	2月18日	壬生川2	10.7	10.7	33.5	0.66	0.04	0.04	0.28	0.73	10	0	0	116
	2月18日	禎瑞1	10.7	10.7	33.4	0.53	0.04	0.08	0.25	0.64	9	0	0	120
	2月18日	禎瑞2	10.8	10.9	33.5	0.35	0.04	0.03	0.27	0.42	6	0	0	10
	2月18日	西条1	10.9	10.9	33.3	0.20	0.05	0.06	0.26	0.31	4	0	0	52
	2月18日	西条2	10.8	10.9	33.5	0.13	0.05	0.05	0.26	0.23	3	0	0	36
	2月18日	ひうち1	10.7	10.6	33.3	0.22	0.06	0.11	0.21	0.39	5	0	0	82
	2月18日	ひうち2	10.6	10.6	33.5	0.05	0.05	0.07	0.19	0.17	2	0	0	48
弓削	2月10日	港内	11.0	-		0.14	0.05	0.05	0.35	0.23	3			
	2月10日	豊島	11.5	-		0.23	0.06	0.09	0.35	0.38	5			
	2月10日	狩尾	11.1	-		0.25	0.05	0.37	0.33	0.67	9			
	2月10日	百貫	11.0	-		0.21	0.04	0.12	0.34	0.37	5			
	2月10日	馬立	11.0	-		0.09	0.04	0.17	0.27	0.30	4			
	2月17日	港内	11.2	-		0.35	0.09	0.12	0.38	0.56	8	0	0	20
	2月17日	豊島	11.5	-		0.70	0.07	0.07	0.41	0.84	12	0	0	10
	2月17日	狩尾	11.1	-		0.51	0.08	0.10	0.37	0.70	10	0	0	8
	2月17日	百貫	11.1	-		0.39	0.06	0.07	0.36	0.53	7	0	0	30
	2月17日	馬立	11.1	-		0.29	0.08	0.04	0.37	0.41	6	0	0	18


※弓削地区については、2月10日の調査結果を併せて掲載しています。

ノリ漁場栄養塩濃度 DIN ガンマ


観測日: 令和8年2月18日 表層



ノリ養殖漁場栄養塩速報 No.17



令和7年度西条地区水温の推移



令和7年度弓削地区水温の推移

令和7年度 ノリ養殖漁場栄養塩速報 No.18

ノリ養殖漁業者・関係者 様

令和8年2月24日

愛媛県水産研究センター栽培資源研究所


水温は、平年比+2.2～+2.5℃となっております。
栄養塩濃度は、1～11ガンマとなっております。
珪藻類については、大型種は確認されていません。

栄養塩の測定は毎週水曜日に実施しますので、測定当日午前中までに栽培資源研究所 東予駐在(東予地方局西条第2庁舎内 西条市丹原町)に持込み願います。
次回は3月4日水曜日の実施を予定しています。


地区	調査日	場所	水温		塩分 psu	NH4	NO2	NO3	PO4	DIN	DIN	珪藻密度 (細胞/mL)		
			表層	底層		μ M	μ M	μ M	μ M	μ M	ガンマ	Coscin.	Eucampia	その他
西条	2月24日	壬生川1	12.1	12.1	33.4	0.69	0.03	0.08	0.25	0.80	11	0	0	236
	2月24日	壬生川2	12.3	11.9	33.0	0.14	0.03	0.05	0.23	0.22	3	0	0	72
	2月24日	禎瑞1	12.1	12.1	33.4	0.14	0.03	0.04	0.21	0.21	3	0	0	106
	2月24日	禎瑞2	12.1	11.8	33.6	0.08	0.03	0.09	0.27	0.20	3	0	0	8
	2月24日	西条1	12.3	12.2	33.3	0.05	0.03	0.02	0.18	0.10	1	0	0	162
	2月24日	西条2	12.2	11.6	33.3	0.02	0.04	0.05	0.20	0.11	1	0	0	152
	2月24日	ひうち1	11.9	11.3	33.3	-	0.04	0.15	0.15	0.19	3	0	0	34
	2月24日	ひうち2	12.0	11.4	33.4	0.03	0.04	0.04	0.18	0.11	1	0	0	16

ノリ漁場栄養塩濃度 DIN ガンマ

観測日: 令和8年2月24日 表層



ノリ養殖漁場栄養塩速報 No.18



令和7年度西条地区水温の推移

令和7年度 ノリ養殖漁場栄養塩速報 No.19

ノリ養殖漁業者・関係者 様

令和8年3月5日

愛媛県水産研究センター栽培資源研究所


水温は、平年比+1.3～+1.7℃となっております。
栄養塩濃度は、4～48ガンマとなっております。
珪藻類については、大型種は確認されていません。

栄養塩の測定は毎週水曜日に実施しますので、測定当日午前中までに栽培資源研究所 東予駐在(東予地方局西条第2庁舎内 西条市丹原町)に持込み願います。
次回は3月11日水曜日の実施を予定しています。


地区	調査日	場所	水温		塩分 psu	NH4	NO2	NO3	PO4	DIN	DIN	珪藻密度 (細胞/mL)		
			表層	底層		μ M	μ M	μ M	μ M	μ M	ガンマ	Coscin.	Eucampia	その他
西条	3月5日	壬生川1	11.8	11.7	32.7	0.42	0.02	0.32	0.12	0.76	11	0	0	108
	3月5日	壬生川2	11.9	11.9	32.8	0.12	0.02	0.31	0.14	0.44	6	0	0	156
	3月5日	禎瑞1	11.8	12.1	31.7	0.96	0.06	2.38	0.20	3.40	48	0	0	142
	3月5日	禎瑞2	11.9	12.1	32.4	0.34	0.03	0.56	0.16	0.93	13	0	0	124
	3月5日	西条1	12.1	12.3	32.5	0.34	0.03	0.61	0.16	0.97	14	0	0	114
	3月5日	西条2	11.8	12.0	32.7	0.06	0.02	0.47	0.15	0.55	8	0	0	8
	3月5日	ひうち1	12.0	12.1	33.0	0.07	0.02	0.20	0.17	0.29	4	0	0	20
	3月5日	ひうち2	11.9	12.0	32.6	0.25	0.03	0.65	0.16	0.93	13	0	0	82

ノリ漁場栄養塩濃度 DIN ガンマ

観測日: 令和8年3月5日 表層



ノリ養殖漁場栄養塩速報 No.19



令和7年度西条地区水温の推移

令和7年度 ノリ養殖漁場栄養塩速報 No.20

ノリ養殖漁業者・関係者 様

令和8年3月11日

愛媛県水産研究センター栽培資源研究所


水温は、平年比+0.8～+1.3℃となっております。
栄養塩濃度は、1～104ガンマとなっております。
珪藻類については、大型種は確認されていません。

今回をもちまして、令和7年度の「ノリ養殖漁場栄養塩速報」の更新は終了いたします。ご協力頂きありがとうございました。


地区	調査日	場所	水温		塩分 psu	NH4	NO2	NO3	PO4	DIN	DIN	珪藻密度（細胞/mL）		
			表層	底層		μ M	μ M	μ M	μ M	μ M	ガンマ	Coscin.	Eucampia	その他
西条	3月11日	壬生川1	11.8	12.1	32.5	0.50	0.09	1.79	0.25	2.37	33	0	0	226
	3月11日	壬生川2	12.0	11.9	33.2	0.08	0.02	0.01	0.13	0.11	2	0	0	84
	3月11日	禎瑞1	12.0	12.1	32.9	0.05	0.03	0.15	0.21	0.23	3	0	0	214
	3月11日	禎瑞2	11.7	12.0	33.0	0.03	0.03	0.08	0.17	0.14	2	0	0	162
	3月11日	西条1	11.5	12.3	29.3	3.11	0.27	4.04	0.30	7.43	104	0	0	82
	3月11日	西条2	11.7	11.9	33.1	0.04	0.03	0.04	0.15	0.10	1	0	0	54
	3月11日	ひうち1	11.6	12.0	33.1	－	0.04	－	0.15	0.04	1	0	0	96
	3月11日	ひうち2	11.7	11.9	33.1	0.09	0.03	0.00	0.16	0.12	2	0	0	114

ノリ漁場栄養塩濃度 DIN ガンマ

観測日: 令和8年3月11日 表層



ノリ養殖漁場栄養塩速報 No.20



令和7年度西条地区水温の推移