



# 家畜保健衛生所だより

R7.2.14

## 春先に向けた吸血昆虫対策の徹底を！！

昨年11月に福岡県で国内初のランピースキン病の発生が確認されて以降、令和7年2月13日現在、**福岡県19例、熊本県3例**の計**22例**が発生しています。

本病は主に吸血昆虫が媒介する伝染病です。吸血昆虫の活動が活発になる春先以降、本病が再流行するリスクが高くなります。今の段階から、春先に向けた吸血昆虫対策を実施しましょう。(特に、**個体数や吸血頻度の高いサシバエ対策が重要です。**)

### ⚠️ サシバエ等吸血昆虫対策について ⚠️

#### I. 卵、幼虫及びさなぎ対策

- 春先以降の成虫の発生を減らすため、冬のうちの対策が重要です！
- サシバエのさなぎが存在する**堆肥は、適切な頻度での切り返し(週に一回程度)**を行う。
- 成牛舎の隅や子牛の牛床全体に**昆虫成長制御剤(IGR剤)**を散布。
- 牛舎壁の隅や溝、ウォーターカップの下、通路のゴムマットの下やその隙間等の清掃。**

#### II. 成虫対策

- 春先の比較的涼しい時期から**殺虫剤の散布を行うことが重要。**
- サシバエが薬剤抵抗性を獲得しないように、**異なる種類の薬剤をローテーションで使用すること。**
- 防虫ネット及びハエ取り紙の牛舎への設置**や、サシバエの休息場所となる**牛舎周辺の草刈り等**を実施する。
- 車両洗淨・消毒**や**車体・車内への殺虫剤の散布**により、**車両等を介した伝播を防止する。**

吸血昆虫はランピースキン病だけではなく、牛伝染性リンパ腫や牛異常産を引き起こす原因となるウイルスも媒介します。吸血昆虫対策の徹底をお願いいたします。

中予家畜保健衛生所


TEL 089-990-1333

携帯 090-6282-6129 (夜間・休日)


# 春先に向けたサシバエ対策で 牛を病気・ストレスから守りましょう！

はて？ 冬季のサシバエ対策？ 春・秋よりサシバエ見ないけど・・・

成虫がいる = 幼虫はもっと潜んでいる



温度とサシバエが卵から成虫になるまでの  
発育日数の関係



冬季は気温が低いので、発育速度が遅い！  
幼虫対策をすれば、殺虫剤を撒く回数も減少！

## 冬季サシバエ対策は、寒いうちから！

スタートが遅れると、ハエの数は爆発的に増加します・・・

### 1. 幼虫対策は、堆肥等の管理とIGR剤の散布！



堆肥の切り返しは  
隅々まで！

牛舎隅など牛が踏まない・糞の取り残しがある場所、  
カーペンなど子牛のいる牛床にIGR剤を散布！

つなぎ牛舎は  
バークリーナーへ散布！


### 2. 成虫対策は、防虫ネットや殺虫剤ローテーションで！



地面や床から2 mは防虫ネットで  
覆えるようにしましょう！  
隙間や穴がないか確認を！



殺虫剤は  
サシバエが飛ぶより  
上を狙って噴霧！



殺虫剤はローテーションを！  
噴霧量が十分か確認！

### 3. 対策は地域ぐるみで！ 関係業者もご一緒に！

# サシバエ対策、ここをチェック！

1

## 堆肥・敷料・残餌はしっかり管理できている！

- ・切り返し等により堆肥発酵時の中心温度が65度になることを確認
- ・牛床は清潔に保たれ、汚れた敷料や残餌は片付いている

いいえ

## IGR剤を撒き、幼虫対策をしている！

- ・バンスクレーパーが通る前にバークリーナーに散布
- ・牛の踏まない所を中心に散布（特に牛舎隅など）

いいえ

## サシバエ幼虫は、堆肥等の管理 + IGR剤で限りなく減らそう

サシバエの成虫 1 匹は、生涯600個もの卵を産む。冬の成虫 1 匹は来シーズンの 1 万匹に相当すると言われるほど、冬季対策が重要。サシバエの活動が低下している冬季だからこそ、地域ぐるみで幼虫対策をしましょう！

すばらしい！

はい

その調子！

はい



子孫残せイ…

2

## 牛舎内でハエ成虫をほぼ見ない

いいえ

## サシバエ成虫を、牛舎内で見かけたら、対策徹底！

サシバエは農場内でも発生するし、他所からも飛んだり運ばれたりしてやってくる。地域ぐるみでの対策が重要。サシバエの持ち出しや持ち込みがないよう農場出入り業者にも車内の殺虫をお願いしましょう。

みんなのお手本！

はい



ココハ住対イ～

## サシバエ成虫対策 3つのポイント

### 1. 殺虫剤はローテーション

同じ殺虫剤を連用していると、生き延びたサシバエが耐性を持つことがある。殺虫剤が効きにくくなる前に、系統が異なる殺虫剤とローテーションで回していこう。十分な濃度・噴霧量で散布しているかも要チェック。

### 2. 防虫ネットの設置

地面から2mの高さまで床から天井に向けて設置。穴が開いてないか定期的にチェック。

### 3. 下草刈りや防草シートの設置

サシバエが日中休息する牛舎周辺の下草を刈ろう。防草シート設置も効果的。