



家畜保健衛生所だより




R6.11.19

岐阜県本巣市で高病原性鳥インフルエンザ(HPAI)発生！ (国内9例目)

11月19日、岐阜県本巣市の採卵鶏農場で高病原性鳥インフルエンザ(HPAI)の疑似患畜が確認されました。10月17日の初発生(北海道厚真町 肉用鶏農場)から約1か月で9例目の発生となり、過去最大の発生となった令和4年シーズンと同じようなペースで続発しています。国内いつどこで発生してもおかしくない状況です。引き続き飼養衛生管理の徹底をお願いします！

<発生概要>

- ・所在地 岐阜県本巣市
- ・飼養羽数 約1.5万羽(採卵鶏)
- ・発生経緯
 - 11/18 死亡羽数が増加している旨の通報を受け農場へ立入、簡易検査陽性
 - 11/19 HPAI 疑似患畜と確認



国内野鳥での発生状況 11道県 31事例(11月18日時点)

※⑥香川県、⑦岩手県は疫学関連農場あり

11/5 滋賀県ヒドリガモ(26例目)、11/9 福井県ハヤブサ(27例目)、10/29 鳥取県野鳥糞便(28例目)、
11/10 北海道ハシブトガラス(29例目)、11/11 鹿児島県環境水(30例目)、11/13 福島県オオハクチョウ(31例目)


★消毒命令発令中！期間: 11月11日~12月10日

農場の消毒徹底をお願いします！

① 鶏舎外縁部・農場境界内縁部に十分な消石灰量を「継続」して散布のこと

☑「十分な消石灰量」とは、1m幅に対し、 $1.0\text{kg}/\text{m}^2$ ($20\text{m}^2/1$ 袋(20kg))です。

☑降雨により消石灰が固化した場合や、強風等で消石灰が少なくなった場合、消毒効果が減弱します。こまめに確認し、必要量を再度散布願います。



② 鶏舎ごとの長靴の履き替えを！

☑外用と鶏舎内専用の長靴を置く場所にはスノコを置くなど、交差を防いでください。

③ 野生動物侵入防止のため家きん舎の破損箇所等の修繕を！

中予家畜保健衛生所

電話 089-990-1333

090-6282-6129 (休日・夜間)